

ARABIC SUMMARY

الملخص العربى

إن الهدف من هذه الدراسة هو فحص وتشخيص وتبيان العلاقة بين إرتجاع العصارة المرارية من الإثنى عشر إلى المعدة فى حالات إلتهاب المرارة المزمنة ذى الحصوات وإستئصال الحويصلة المرارية .

وقد تم إختيار ثلاث مجموعات من المرضى من مستشفيات كلية طب بنها أولهم لا يعانون من أعراض مرضية بالجهاز الهضمى وهم عشرة والمجموعة الثانية مكونة من عشرين مريضا مصابين بإلتهاب المرارة المزمن ذى الحصوات ولم تجر لهم عمليات جراحية وأختيرت المجموعة الثالثة وعددها عشرون من المرضى الذين أجريت لهم عملية إستئصال الحويصلة المرارية . وقد لوحظ أن بعض مرضى المجموعتين الثانية والثالثة يعانون من إضطرابات بالجهاز الهضمى وبخاصة فى منطقة الوسط أعلى البطن وهذه الإضطرابات مصحوبة بغثيان وأحيانا بقيئ مرير الطعم لونه أخضر كما أن هذه الأعراض لا تختفى بتعاطى المسكنات أو عقارات ضد الحموضة .

وقد تعرضت المجموعات الثلاث للفحوصات التالية .

- (١) فحص إكلينكى كامل .
- (٢) الفحص الروتينى المعملى ما قبل العمليات .
- (٣) أشعة بالموجات فوق الصوتية على البطن لمعرفة حالة الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس .
- (٤) فحص الجزء العلوى من الجهاز الهضمى ويشتمل على المريء والمعدة والإثنى عشر بالمنظار قبل وبعد العملية . وأخذت عينة فى حالات إلتهاب المعدة الموجب . وقد أنتت نتائج المنظار سالبة بالنسبة للمجموعة الأولى عدا مريضا واحدا وموجبة فى ست حالات من عشرين مريضا فى المجموعة الثانية قبل العملية زاد عليهم إثنان بعد العملية وموجبة أيضا فى عشر حالات من عشرين مريضا فى المجموعة الثالثة .

(٥) الفحص الباثولوجى لعينات المعدة التى تم أخذها بالمنظار فى الحالات التى بها إرتجاع فى السائل المرارى من الإثنى عشر إلى المعدة .

وكانت نتيجة الفحص كالأتى :

المجموعة الأولى : خالية من أى تأثير .

المجموعة الثانية : عدد ست حالات بها إلتهابات مزمنة بغشاء المعدة الداخلى قبل العملية

زاد عليهم إثنان بعد العملية

المجموعة الثالثة : عدد عشر حالات بها إلتهابات مزمنة بغشاء المعدة الداخلى .

وفى نهاية البحث نقترح أن يكون هناك فحص روتينى بالمنظار للجزء العلوى من الجهاز الهضمى فى حالات إلتهاب المرارة المزمن ذى الحصوات وذلك لمعرفة حالة المرئ والمعدة والإثنى عشر . كما ننصح بإجراء ذلك مرة أخرى فى الحالات التى يتم فيها إستئصال الحويصلة المرارية لمعرفة الفرق قبل وبعد إستئصالها وإمكانية التغلب على أعراض الجهاز الهضمى المصاحبة بعد إجراء العملية .