

الملخص العربي

الدراسة المقدمة توضح ان استخدام فحص التصوير السينمائي متباين الاطوار بالرنين المغناطيسي في حالات اضطرابات سريان السائل الدماغي ،فحص هام ومكمل للفحص بالرنين المغناطيسي العادي حيث انه يظهر بوضوح مسارات السائل المخى داخل البطينات والصهاريج المخية كما انه يمكن عن طريقه عمل تقييم تقديرى لحركة السائل المخى ، بالإضافة الى ذلك يمكن قياس سرعة ومقدار هذه الحركة واتجاهها مما يساعد كثيرا فى تمييز نوع وكمية حركة السائل المخى داخل مساراته في التجاويف المخية.

ومن ثم يمكن بهذا الفحص التفرقة بين حالات الاستسقاء الدماغي ذات الضغط العادي وبين حالات الضمور المخى .وكذلك تمييز حالات الاستسقاء الدماغي الانسدادى في قناة سيلفيوس، بالإضافة إلى ان له دور كبير في تمييز حركة السائل المخى في حالات الاستسقاء الدماغي المصاحبة لبعض انواع العيوب الخلقية بصورة اكثرا وضوحا واكثر دقة مما يجعل لهذا الفحص دورا مميزا في هذه الحالات .

وقد اوضح هذا الفحص ان سرعة ومعدل حركة سريان السائل المخى في قناة سيلفيوس في حالات الاستسقاء الدماغي ذات الضغط العادي تكون أعلى كثيرا عنها في الحالات الطبيعية كما اوضح مدى احتياج المريض لاجراء عملية تحويلية .

كما اوضح انه في حالات الضمور المخى ، تكون سرعة ومعدل حركة السائل المخى في قناة سيلفيوس اقل من نظيراتها في الحالات الطبيعية اما في حالات الاستسقاء الدماغي الانسدادى في قناة سيلفيوس فان هذه الحركة تكون شبه منعدمة .

واخيرا فان الفحص قد اوضح ان طبيعة حركة السائل المخى في بعض انواع العيوب الخلقية مثل حالات (كياري) بها تغيير في ديناميكية حركة السائل المخى مما يشير إلى وجود سبب في طبيعة حركة السائل المخى وراء ظهور الاعراض الاكلينيكية المصاحبة لهذه الحالات .