

---

# Tratment of pediatric diaphyseal femoral frctures by flexible retrograde intramedullary nail

**Mohamed Hussein Mahmoud Fadel**

تشمل هذه الدراسة خمسة وعشرون حالة من كسور عظام الفخذ في الأطفال و معالجتها بواسطة مسمار نخاعي مرنيترأوح أعمار المرضى من سن خمسة إلى إحدى عشر عاما منهم سبعة عشر ذكر و ثمانى إناثويتنوع شكل الكسور من مائل ويشمل أربعة عشر حالة و مستقيم عشرة و مفتت حالة واحدة و يختلف مستوي الكسر في الحالات في هذه الدراسة كالآتي: الجزء الأوسط من عظمة الفخذ خمسة عشر حالة والجزء العلوي عشرة حالات.كل الحالات تم مناظرتها إكلينيكيًا و فحصها بواسطة الأشعة العادية قبل الجراحة وتتراوح مدة البقاء في الجبس بعد الجراحة من ثلاثة إلى ستة أسابيع متابعة الحالات كانت من ثلاثة إلى تسعة اسهر بعد الجراحة و من خلال الدراسة تبين إن صغر السن و الكسور اعلي عظمة الفخذ و الكسور المائلة و المستقيمة وجد سرعة في الحام عن باقي الحالاتالمشاكل التي واجهت الدراسة هي اعوجاج عظمة الفخذ مع الكسر المفتت